

◆大腸がん

作成日 2025年6月1日

九州鉄道記念病院

レジメン名	抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク
mFOLFOX6					14日間	中等度
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	day1		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	day1		
	5-FU	400 mg/m ²	急速静注	day1		
	5-FU	2400 mg/m ²	持続静注（46hr）	day1		
備考						
mFOLFOX6+Bev					14日間	中等度
	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	day1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	day1		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	day1		
	5-FU	400 mg/m ²	急速静注	day1		
	5-FU	2400 mg/m ²	持続静注（46hr）	day1		
備考						
mFOLFOX6+Pmab					14日間	中等度
	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注	day1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	day1		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	day1		
	5-FU	400 mg/m ²	急速静注	day1		
	5-FU	2400 mg/m ²	持続静注（46hr）	day1		
備考						

◆大腸がん

作成日 2025年6月1日

九州鉄道記念病院

レジメン名	抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク
mFOLFOX6+Cmab					14日間	中等度
	セツキシマブ	250 mg/m ²	点滴静注	day1,8		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	day1		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	day1		
	5-FU	400 mg/m ²	急速静注	day1		
	5-FU	2400 mg/m ²	持続静注（46hr）	day1		
備考 Cmab：初回は400 mg/m ²						
FOLFIRI					14日間	中等度
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	day1		
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	day1		
	5-FU	400 mg/m ²	急速静注	day1		
	5-FU	2400 mg/m ²	持続静注（46hr）	day1		
備考						
FOLFIRI+Bev					14日間	中等度
	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	day1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	day1		
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	day1		
	5-FU	400 mg/m ²	急速静注	day1		
	5-FU	2400 mg/m ²	持続静注（46hr）	day1		
備考						

◆大腸がん

作成日 2025年6月1日

九州鉄道記念病院

レジメン名	抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク
FOLFIRI+RAM					14日間	中等度
	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	day1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	day1		
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	day1		
	5-FU	400 mg/m ²	急速静注	day1		
	5-FU	2400 mg/m ²	持続静注（46hr）	day1		
備考						
FOLFIRI+AFL					14日間	中等度
	アフリベルセプト ベータ	4 mg/kg	点滴静注	day1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	day1		
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	day1		
	5-FU	400 mg/m ²	急速静注	day1		
	5-FU	2400 mg/m ²	持続静注（46hr）	day1		
備考						
FOLFIRI+Pmab					14日間	中等度
	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注	day1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	day1		
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	day1		
	5-FU	400 mg/m ²	急速静注	day1		
	5-FU	2400 mg/m ²	持続静注（46hr）	day1		
備考						

◆大腸がん

作成日 2025年6月1日

九州鉄道記念病院

レジメン名	抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク
FOLFIRI+Cmab					14日間	中等度
	セツキシマブ	250 mg/m ²	点滴静注	day1,8		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	day1		
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	day1		
	5-FU	400 mg/m ²	急速静注	day1		
	5-FU	2400 mg/m ²	持続静注（46hr）	day1		
	備考 Cmab：初回は400 mg/m ²					
mFOLFOXIRI					14日間	高度
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	day1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	day1		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	day1		
	5-FU	2400 mg/m ²	持続静注（46hr）	day1		
	備考					
mFOLFOXIRI+Bev					14日間	高度
	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	day1		
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	day1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	day1		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	day1		
	5-FU	2400 mg/m ²	持続静注（46hr）	day1		
	備考					

◆大腸がん

作成日 2025年6月1日

九州鉄道記念病院

レジメン名	抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク
CapeOX					21日間	中等度
	カペシタビン	2000 mg/㎡	経口	day1-14		
	オキサリプラチン	130 mg/㎡	点滴静注	day1		
	備考 Cape : 1回1000 mg/㎡を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服					
CapeOX+Bev					21日間	中等度
	カペシタビン	2000 mg/㎡	経口	day1-14		
	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注	day1		
	オキサリプラチン	130 mg/㎡	点滴静注	day1		
	備考 Cape : 1回1000 mg/㎡を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服					
Cape+Bev					21日間	軽度
	カペシタビン	2000 mg/㎡	経口	day1-14		
	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注	day1		
	備考 Cape : 1回1000 mg/㎡を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服					
SOX					21日間	中等度
	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80 mg/㎡	経口	day1-14		
	オキサリプラチン	130 mg/㎡	点滴静注	day1		
	備考 S-1 : 1回40 mg/㎡を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服					

◆大腸がん

作成日 2025年6月1日

九州鉄道記念病院

レジメン名	抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク
SOX+Bev					21日間	中等度
	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80 mg/m ²	経口	day1-14		
	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注	day1		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	day1		
備考 S-1：1回40 mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服						
SIR					21日間	中等度
	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80 mg/m ²	経口	day1-14		
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	day1		
備考 S-1：1回40 mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服						
SIRB					21日間	中等度
	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80 mg/m ²	経口	day1-14		
	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注	day1		
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	day1		
備考 S-1：1回40 mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服						
IRIS					28日間	中等度
	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80 mg/m ²	経口	day1-14		
	イリノテカン	125 mg/m ²	点滴静注	day1,15		
備考 S-1：1回40 mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服						

◆大腸がん

作成日 2025年6月1日

九州鉄道記念病院

レジメン名	抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク
IRIS+Bev					28日間	中等度
	テガフル・キメラシル・オテラシル	80 mg/m ²	経口	day1-14		
	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	day1,15		
	イリノテカン	100 mg/m ²	点滴静注	day1,15		
	備考 S-1：1回40 mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服					
S-1+Bev					21日間	軽度
	テガフル・キメラシル・オテラシル	80 mg/m ²	経口	day1-14		
	ベバシズマブ	7.5 mg/kg	点滴静注	day1		
	備考 S-1：1回40 mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服					
TFTD+Bev					28日間	中等度
	トリフルリジン・チピラシル	70 mg/m ²	経口	day1-5、8-12		
	ベバシズマブ	5 mg/kg	点滴静注	day1,15		
	備考 TFTD：1回35 mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay6朝まで内服、Day8夕からDay13朝まで内服					
CPT-11					14日間	中等度
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	day1		
	備考					
CPT-11+Pmab					14日間	中等度
	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注	day1		
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	day1		
	備考					

◆大腸がん

作成日 2025年6月1日

九州鉄道記念病院

レジメン名	抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク
Pmab					14日間	最小度
	パニツムマブ	6 mg/kg	点滴静注	day1		
	備考					
Cmab					7日間	最小度
	セツキシマブ	250 mg/m ²	点滴静注	day1		
	備考 Cmab : 初回は400 mg/m ²					
Nivo					14日間	最小度
	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	day1		
	備考 MSI-high大腸がんに適応。480 mg/bodyを28日間隔で投与する場合もある					
Pembrolizmab					21日間	最小度
	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	day1		
	備考 MSI-high大腸がんに適応。400 mg/bodyを42日間隔で投与する場合もある					
Nivo+IPI					21日間	最小度
	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	day1		
	イピリムマブ	1 mg/kg	点滴静注	day1		
	備考 MSI-high大腸がんに適応。2剤併用は4回まで、それ以降はニボルマブ単剤で継続。					

◆大腸がん

作成日 2025年6月1日

九州鉄道記念病院

レジメン名	抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク
PER+Tmab					21日間	最小度
	ペルツズマブ	420 mg/body	点滴静注	day1		
	トラスツズマブ	6 mg/kg	点滴静注	day1		
備考 PER : 初回は840 mg/body Tmab : 初回は8 mg/kg						
PHESGO					21日間	最小度
	ペルツズマブ・トラスツズマブ	IN、MA	皮下注	day1		
備考 PHESGO : 初回はIN 2回目以降はMA						
Encoratinib+Binimetinib+Cmab					7日間	最小度
	エンコラフェニブ	300 mg/日	経口	day1-7		
	ビニメチニブ	90 mg/日	経口	day1-7		
	セツキシマブ	250 mg/m ²	点滴静注	day1		
備考 BRAF遺伝子変異陽性の大腸がんに適応。Cmab : 初回は400 mg/m ²						
Encoratinib+Cmab					7日間	最小度
	エンコラフェニブ	300 mg/日	経口	day1-7		
	セツキシマブ	250 mg/m ²	点滴静注	day1		
備考 BRAF遺伝子変異陽性の大腸がんに適応。Cmab : 初回は400 mg/m ²						