

◆胃がん

作成日 2025年6月1日
九州鉄道記念病院

レジメン名	抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク
CapeOX					21日間	中等度
	カペシタビン	2000 mg/m ²	経口	day1-14		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	day1		
備考 Cape : 1回1000 mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服						
SOX					21日間	中等度
	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80 mg/m ²	経口	day1-14		
	オキサリプラチン	100 mg/m ²	点滴静注	day1		
備考 S-1 : 1回40 mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服						
mFOLFOX6					14日間	中等度
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	day1		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	急速静注	day1		
	5-FU	400 mg/m ²	急速静注	day1		
	5-FU	2400 mg/m ²	持続静注 (46hr)	day1		
備考						
S-1+DTX					21日間	軽度
	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80 mg/m ²	経口	day1-14		
	ドセタキセル	40 mg/m ²	点滴静注	day1		
備考 S-1 : 1回40 mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1からDay14まで内服。				DTX : 補助化学療法の場合2～7コースのみ		

◆胃がん

作成日 2025年6月1日

九州鉄道記念病院

レジメン名	抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク
CapeOX+Nivo					21日間	中等度
	ニボルマブ	360 mg/body	点滴静注	day1		
	カペシタビン	2000 mg/m ²	経口	day1-14		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	day1		
	備考 Cape：1回1000 mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服					
SOX+Nivo					21日間	中等度
	ニボルマブ	360 mg/body	点滴静注	day1		
	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80 mg/m ²	経口	day1-14		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	day1		
	備考 S-1：1回40 mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服					
mFOLFOX6+Nivo					14日間	中等度
	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	day1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	day1		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	急速静注	day1		
	5-FU	400 mg/m ²	急速静注	day1		
	5-FU	2400 mg/m ²	持続静注（46hr）	day1		
	備考					

◆胃がん

作成日 2025年6月1日
九州鉄道記念病院

レジメン名	抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク
CapeOX+Pembrolizmab					21日間	中等度
	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	day1		
	カペシタビン	2000 mg/m ²	経口	day1-14		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	day1		
備考 Cape : 1回1000 mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服						
SOX+Pembrolizmab					21日間	中等度
	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	day1		
	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80 mg/m ²	経口	day1-14		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	day1		
備考 S-1 : 1回40 mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服						
CapeOX+Tmab					21日間	中等度
	トラスツズマブ	6 mg/kg	点滴静注	day1		
	カペシタビン	2000 mg/m ²	経口	day1-14		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	day1		
備考 Cape : 1回1000 mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服				Tmab : 初回は8 mg/kg		
SOX+Tmab					21日間	中等度
	トラスツズマブ	6 mg/kg	点滴静注	day1		
	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80 mg/m ²	経口	day1-14		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	day1		
備考 S-1 : 1回40 mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服				Tmab : 初回は8 mg/kg		

◆胃がん

作成日 2025年6月1日

九州鉄道記念病院

レジメン名	抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク
CapeOX+Tmab+Pembrolizmab					21日間	中等度
	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	day1		
	トラスツズマブ	6 mg/kg	点滴静注	day1		
	カペシタビン	2000 mg/㎡	経口	day1-14		
	オキサリプラチン	130 mg/㎡	点滴静注	day1		
備考 Cape：1回1000 mg/㎡を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服				Tmab：初回は8 mg/kg		
SOX+Tmab+Pembrolizmab					21日間	中等度
	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	day1		
	トラスツズマブ	6 mg/kg	点滴静注	day1		
	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80 mg/㎡	経口	day1-14		
	オキサリプラチン	130 mg/㎡	点滴静注	day1		
備考 S-1：1回40 mg/㎡を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服				Tmab：初回は8 mg/kg		
T-DXd					21日間	中等度
	トラスツズマブ デルクステカン	6.4 mg/kg	点滴静注	day1		
備考						

◆胃がん

作成日 2025年6月1日

九州鉄道記念病院

レジメン名	抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク
CapeOX+Zolbetuximab					21日間	高度
	ゾルベツキシマブ	600 mg/m ²	点滴静注	day1		
	カペシタビン	2000 mg/m ²	経口	day1-14		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	day1		
備考 Cape：1回1000 mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服				Zolbetuximab：初回は800 mg/m ²		
mFOLFOX6+Zolbetuximab					14日間	高度
	ゾルベツキシマブ	400 mg/m ²	点滴静注	day1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	day1		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	急速静注	day1		
	5-FU	400 mg/m ²	急速静注	day1		
	5-FU	2400 mg/m ²	持続静注（46hr）	day1		
備考 Zolbetuximab：初回は800 mg/m ²						
RAM					14日間	最小度
	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	day1		
備考						
RAM+PTX					28日間	軽度
	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	day1,15		
	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15		
備考						

◆胃がん

作成日 2025年6月1日

九州鉄道記念病院

レジメン名	抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク
CPT-11	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	day1	14日間	中等度
備考						
Nivo	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	day1	14日間	最小度
備考 480 mg/bodyを28日間隔で投与する場合もある						
SP	テガフル・ギメラシル・オテラシル シスプラチン	80 mg/m ² 60 mg/m ²	経口 点滴静注	day1-21 day8	35日間	高度
備考 S-1 : 1回40 mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1からDay21まで内服						