

◆乳がん

レジメン名	抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク
EC					21日間	高度
	エピルビシン	90 mg/m ²	点滴静注	day1		
	シクロホスファミド	600 mg/m ²	点滴静注	day1		
	備考	ジーラスタを併用することがあります				
dose-dense EC					14日間	高度
	エピルビシン	90 mg/m ²	点滴静注	day1		
	シクロホスファミド	600 mg/m ²	点滴静注	day1		
	備考	ジーラスタを併用します				
FEC					21日間	高度
	エピルビシン	100 mg/m ²	点滴静注	day1		
	シクロホスファミド	500 mg/m ²	点滴静注	day1		
	5-FU	500 mg/m ²	点滴静注	day1		
	備考	ジーラスタを併用することがあります				
TC					21日間	中等度
	ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注	day1		
	シクロホスファミド	600 mg/m ²	点滴静注	day1		
	備考	ジーラスタを併用することがあります				

◆乳がん

更新日 2025年6月1日

九州鉄道記念病院

レジメン名	抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク
dose-dense PTX	パクリタキセル	175 mg/m ²	点滴静注	day1	14日間	軽度
	備考 ジーラスタを併用します					
DTX	ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注	day1	21日間	軽度
	備考					
T-DM1	トラスツズマブ エムタンシン	3.6 mg/kg	点滴静注	day1	21日間	軽度
	備考					
T-DXd	トラスツズマブ デルクステカン	5.4 mg/kg	点滴静注	day1	21日間	中等度
	備考					
Dato-DXd	ダトポタマブ デルクステカン	6 mg/kg	点滴静注	day1	21日間	中等度
	備考					
SG	サシツズマブ ゴビテカン	10 mg/kg	点滴静注	day1,8	21日間	中等度
	備考					

◆乳がん

更新日 2025年6月1日

九州鉄道記念病院

レジメン名	抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク
PER+Tmab+DTX					21日間	軽度
	ペルツズマブ	420 mg/body	点滴静注	day1		
	トラスツズマブ	6 mg/kg	点滴静注	day1		
	ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注	day1		
	備考 PER : 初回は840 mg/body Tmab : 初回は8 mg/kg					
PER+Tmab					21日間	最小度
	ペルツズマブ	420 mg/body	点滴静注	day1		
	トラスツズマブ	6 mg/kg	点滴静注	day1		
	備考 PER : 初回は840 mg/body Tmab : 初回は8 mg/kg					
PHESGO+DTX					21日間	軽度
	ペルツズマブ・トラスツズマブ	IN、MA	皮下注	day1		
	ドセタキセル	75 mg/m ²	点滴静注	day1		
	備考 PHESGO : 初回はIN 2回目以降はMA					
PHESGO					21日間	最小度
	ペルツズマブ・トラスツズマブ	IN、MA	皮下注	day1		
	備考 PHESGO : 初回はIN 2回目以降はMA					

◆乳がん

更新日 2025年6月1日

九州鉄道記念病院

レジメン名	抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク
Eribulin	エリ布林	1.4 mg/m ²	点滴静注	day1,8	21日間	軽度
備考						
VNB	ビノレルビン	25 mg/m ²	点滴静注	day1,8	21日間	最小度
備考						
Bmab+PTX	ベバシズマブ パクリタキセル	10 mg/kg 90 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	day1,15 day1,8,15	28日間	軽度
備考						
Atezolizumab+nab-PTX	アテゾリズマブ パクリタキセル（アルブミン懸濁型）	840 mg/body 100 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	day1,15 day1,8,15	28日間	軽度
備考						
Pembrolizumab+GEM+CBDCA	ペムブロリズマブ ゲムシタビン カルボプラチン	200 mg/body 1000 mg/m ² AUC=2	点滴静注 点滴静注 点滴静注	day1 day1,8 day1,8	21日間	中等度
備考						

◆乳がん

レジメン名	抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク
Pembrolizumab+PTX+wCBDCA					21日間	中等度
	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	day1		
	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15		
	カルボプラチン	AUC=1.5	点滴静注	day1,8,15		
備考						
Pembrolizumab+PTX+3wCBDCA					21日間	中等度
	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	day1		
	パクリタキセル	80 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15		
	カルボプラチン	AUC=5	点滴静注	day1		
備考						
Pembrolizumab+EC					21日間	高度
	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	day1		
	エピルビシン	90 mg/m ²	点滴静注	day1		
	シクロホスファミド	600 mg/m ²	点滴静注	day1		
備考 ジーラスタを併用することがあります						
Pembrolizumab					21日間	最小度
	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	day1		
備考 400mg/42日間レジメンも有り						