

作成日 2025年6月1日

九州鉄道記念病院

◆胆道がん

レジメン名	抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク
GEM	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	28日間	軽度
	備考					
GEM+S-1	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	day1,8	21日間	中等度
	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80 mg/m ²	経口	day1-14		
	備考 S-1 : 1回40 mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服					
GC	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	day1,8	21日間	中等度
	シスプラチン	25 mg/m ²	点滴静注	day1,8		
	備考					
GC+Durvalumab	デュルバルマブ	1500 mg/body	点滴静注	day1	21日間	中等度
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	day1,8		
	シスプラチン	25 mg/m ²	点滴静注	day1,8		
	備考 最大8サイクル、以降はDurvalumab単剤で維持療法（4週毎）					
GC+Pembrolizumab	ペムブロリズマブ	200 mg/body	点滴静注	day1	21日間	中等度
	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	day1,8		
	シスプラチン	25 mg/m ²	点滴静注	day1,8		
	備考 最大8サイクル、以降はGEM+Pembrolizumabで維持療法					