

◆胃がん

作成日 2021年4月1日

九州鉄道記念病院

レジメン名	抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク
S-1+DTX					21日間	軽度
	ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾂﾗｼﾙ	80 mg/m ²	経口	day1-14		
	ﾄｾﾀｷｾﾙ	40 mg/m ²	点滴静注	day1		
備考 S-1 : 1回40 mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1からDay14まで内服。				DTX : 補助化学療法の場合2～7コースのみ		
SP					35日間	高度
	ﾃｶﾞﾌｰﾙ・ｷﾞﾒﾗｼﾙ・ｵﾂﾗｼﾙ	80 mg/m ²	経口	day1-21		
	ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ	60 mg/m ²	点滴静注	day8		
備考 S-1 : 1回40 mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1からDay21まで内服						
mFOLFOX6					14日間	中等度
	ﾚﾎﾎﾘﾅｰﾄ	200 mg/m ²	点滴静注	day1		
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	85 mg/m ²	急速静注	day1		
	5-FU	400 mg/m ²	急速静注	day1		
	5-FU	2400 mg/m ²	持続静注 (46hr)	day1		
備考						
CapeOX					21日間	中等度
	ｶﾍｼﾀﾋﾞﾝ	2000 mg/m ²	経口	day1-14		
	ｵｷｻﾘﾌﾟﾗﾁﾝ	130 mg/m ²	点滴静注	day1		
備考 Cape : 1回1000 mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服						

◆胃がん

作成日 2021年4月1日

九州鉄道記念病院

レジメン名	抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク
SOX					21日間	中等度
	テガフル・ギメラシル・オテラシル オキサリプラチン	80 mg/m ² 100 mg/m ²	経口 点滴静注	day1-14 day1		
	備考 S-1：1回40 mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服					
RAM					14日間	最小度
	ラムシルマブ	8 mg/kg	点滴静注	day1		
	備考					
RAM+PTX					28日間	軽度
	ラムシルマブ パクリタキセル	8 mg/kg 80 mg/m ²	点滴静注 点滴静注	day1,15 day1,8,15		
	備考					
CPT-11					14日間	中等度
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	day1		
	備考					
Nivo					14日間	最小度
	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	day1		
	備考 480 mg/bodyを28日間隔で投与する場合もある					

◆胃がん

作成日 2021年4月1日

九州鉄道記念病院

レジメン名	抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク
mFOLFOX6+Nivo					14日間	中等度
	ニボルマブ	240 mg/body	点滴静注	day1		
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	day1		
	オキサリプラチン	85 mg/m ²	急速静注	day1		
	5-FU	400 mg/m ²	急速静注	day1		
	5-FU	2400 mg/m ²	持続静注（46hr）	day1		
備考						
CapeOX+Nivo					21日間	中等度
	ニボルマブ	360 mg/body	点滴静注	day1		
	カペシタビン	2000 mg/m ²	経口	day1-14		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	day1		
備考 Cape：1回1000 mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服						
SOX+Nivo					21日間	中等度
	ニボルマブ	360 mg/body	点滴静注	day1		
	テガフル・ギメラシル・オテラシル	80 mg/m ²	経口	day1-14		
	オキサリプラチン	130 mg/m ²	点滴静注	day1		
備考 S-1：1回40 mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服						