

作成日 2021年4月1日

九州鉄道記念病院

◆膵がん

レジメン名	抗がん薬	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	催吐リスク
GEM	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	28日間	軽度
	備考					
GEM+S-1	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	day1,8	21日間	中等度
	テガフル・キメラシル・オテラシル	80 mg/m ²	経口	day1-14		
	備考 S-1 : 1回40 mg/m ² を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服					
GEM+nab-PTX	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15	28日間	中等度
	パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	125 mg/m ²	点滴静注	day1,8,15		
	備考					
mFOLFIRINOX	オキサリプラチン	85 mg/m ²	点滴静注	day1	14日間	高度
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	day1		
	イリノテカン	150 mg/m ²	点滴静注	day1		
	5-FU	2400 mg/m ²	持続静注 (46hr)	day1		
	備考 Day2-4 : DEX 8 mg/Day 1日2回 朝昼食後					
nal-IRI+5FU/LV	イリノテカン(リポソーム製剤)	70 mg/m ²	点滴静注	day1	14日間	中等度
	レボホリナート	200 mg/m ²	点滴静注	day1		
	5-FU	2400 mg/m ²	持続静注 (46hr)	day1		
	備考					