

作成日 2021年4月1日

九州鉄道記念病院

◆胆道がん

| レジメン名   | 抗がん薬             | 投与量                    | 投与方法 | 投与日       | 投与間隔 | 催吐リスク |
|---|------------------|------------------------|------|-----------|------|-------|
| GEM   | ゲムシタビン           | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8,15 | 28日間 | 軽度    |
| 備考  |                  |                        |      |           |      |       |
| GEM+S-1   | ゲムシタビン           | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8    | 21日間 | 中等度   |
|   | テガフル・ギメラシル・オテラシル | 80 mg/m <sup>2</sup>   | 経口   | day1-14   |      |       |
| 備考 S-1 : 1回40 mg/m <sup>2</sup> を1日2回朝夕食後内服。Day1夕からDay15朝まで内服 |                  |                        |      |           |      |       |
| GEM+CDDP  | ゲムシタビン           | 1000 mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | day1,8    | 21日間 | 中等度   |
|   | シスプラチン           | 25 mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 | day1,8    |      |       |
| 備考  |                  |                        |      |           |      |       |